DESCRIPTION

DE DEUX DIFFÉRENS

SERPENS À QUEUE APPLATIE,

ENCORE TRÈS PEU CONNUS;

L'UN AU DOS-BRUN, DU MEXIQUE, ET

L'AUTRE A' ANNEAUX, DES MERS DE L'INDE:

Lesquels ſe conſervent tous deux avec une Variété du dernier dans le CABINET

DE

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME,

MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE ET DE NASSAU, STADHOUDER HEREDITAIRE, GOUVERNEUR, CAPITAINE GENERAL ET AMIRAL DES PROVINCES-UNIES DES PAIS-BAS, &c. &c. &c.

DÉCRIT ET PUBLIÉ PAR

A. VOSMAER,

*Directeur des Cabinets d'Hiſtoire Naturelle & de Curioſités, ainſi que de la Ménagerie de S. A. S. Mgr. le Prince d'*ORANGE *&* NASSAU, *&c. &c. &c. Membre de l'Académie Impériale, Correſpondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, & Membre de la Société des Sciences de Zélande à Vliſſingue, comme auſſi de la Société Hollandoiſe à Haerlem.*

A AMSTERDAM,

CHEZ PIERRE MEYER,

MDCCLXXIV.

HISTOIRE NATURELLE

DU

SERPENT À QUEUE APPLATIE,

ET DOS-BRUN,

Du MEXIQUE.

JE découvris ce rare ſujet, entr'autres choſes curieuſes, lorsqu'en formant le Cabinet, il y a pluſieurs années, SON ALTESSE ROYALE, de Glor. Mém., acheta la Collection de Mr. DE LASSARAZ, pour y être ajoutée. Jusqu'ici je n'ai point rencontré ſon pareil dans aucun Cabinet. Seulement SEBA (*a*) paroît l'avoir eu auſſi; il le dit être du Mexique, & le décrit ſous le nom de *Nixboa Quamquecholla*, ou Serpent rare du Mexique à queue large. Voilà tout ce que nous en trouvons, outre la deſcription de la couleur, & la Figure en eſt très défectueuſe.

Mr. LINNÆUS, ce qui m'étonne, n'a point inſéré dans ſon Syſtème ce Serpent à queue applatie, quoiqu'il aît très bien connu & placé celui dont nous parlerons tantôt, ou une de ſes variétés.

La reſſemblance qui ſe trouve entre celui-ci & le ſuivant, tant dans la forme applatie de la queue, le manque des écailles abdominales, qu'à d'autres égards, me fait préſumer qu'il eſt de la même nature, & que ce ſera ainſi un Animal ou Serpent marin, puiſque par le défaut de nageoires il ſe diſtingue ſuffiſamment des Lamproies ou Anguilles.

(*a*) *Theſ. Tom. II. Tab. LXXVII. Fig. 2. ou plutôt 1., étant mal numerotée.*

DESCRIPTION DU SERPENT A QUEUE APPLATIE, ET DOS-BRUN.

Tab. I I.

L'Animal étant repréſenté ici dans ſa grandeur naturelle, il n'eſt pas beſoin d'en déterminer ultérieurement la meſure.

Sur la tête & tout le long du dos règne une large bande d'un brun obſcur, le reſte eſt d'un jaune clair ou pâle. Des deux côtés, proche l'origine de la queue & ſur la queue ſe voient quelques taches brunes.

En devant, ſur la partie ſupérieure de la bouche ſe montrent, à quelque diſtance l'un de l'autre, deux petits trous ronds, qui ſont peut-être les naſeaux. La tête eſt en deſſus couverte de petits écuſſons, comme à quelques Serpens. Les yeux orbiculaires paroiſſent être bleuâtres, ayant un petit point blanc au milieu; il n'a ni paupieres, ni ouies.

Tout le corps en deſſous, comme ſur le dos, aux flancs & à la queue, eſt garni de très petites écailles plates & ſerrées.

On n'apperçoit pas le moindre indice de nageoires. Le corps paroît arrondi, plus applati des deux côtés vers le bout de la queue.

La queue, qui a environ un pouce de longueur, eſt généralement mince & applatie des deux côtés. On ne voit ni ſous le ventre, ni au bout de la queue, aucune marque de ces écailles abdominales & étroites qu'ont d'ailleurs les Serpens.

HISTOIRE

HISTOIRE NATURELLE
DU
SERPENT A QUEUE APPLATIE,
ET A ANNEAUX,
DES
MERS DE L'INDE.

CE rare petit Serpent à queue applatie, que je ne ſache pas avoir encore été décrit, vient, ainſi que le précédent, de la Collection du Cabinet de Mr. DE LASARRAZ, ſans que l'on connoiſſe ſon origine. Nous ſerions peut-être encore dans la même ignorance, ſi diverſes viſites, dont Mr. BANKS, habile Naturaliſte Anglois, célèbre par ſon Voyage autour du Monde, m'a honoré pendant ſon ſéjour ici, ne nous en avoient fait acquerir quelque connoiſſance ultérieure. Lui ayant montré entr'autres ce ſujet, fort rare chez nous, il m'aſſura en avoir trouvé trois différentes Eſpèces, & en très grande quantité aux lieux ſuivans, ſavoir, dans la Mer Pacifique, le long de la Côte Orientale de la Nouvelle-Hollande, depuis 20 jusqu'à 10 degrés de Latitude Auſtrale. En outre dans la Mer entre la Nouvelle-Guinée & la partie Septentrionale de la Nouvelle-Hollande juſque paſſé la partie Méridionale de l'Iſle Timor. Il me dit encore avoir vu auſſi ces mêmes Eſpèces de Serpens dans les Mers & ſur les Côtes de la Chine. Lorsqu'il faiſoit beau tems & que la Mer étoit calme, on les voyoit nager ſur la ſuperficie, & ſouvent auſſi ſe replonger vers le fonds.

DAMPIER (*b*), dans les Voyages qu'il a fait aux Terres Auſtrales, parle auſſi déja de diverſes Eſpèces de Serpens aquatiques, qu'il avoit vus près de la Côte de la Nouvelle-Hollande; mais la deſcription qu'il en donne, & l'altération que ſouffrent ſurtout les Animaux aquatiques dans la liqueur où ils nous ſont envoyés, ne ſauroient me faire déterminer avec certitude, ſi ce ſont les mêmes Eſpèces, quoique Mr. BANKS, qui m'en parloit en Naturaliſte & témoin oculaire, m'aſſurât poſitivement la choſe.

Voilà tout ce que nous pouvons dire au ſujet de ce rare Animal; mais, depuis peu, j'ai encore acquis une troiſieme variété très remarquable, l'ayant troquée contre des doublets, méthode au moyen de laquelle j'ai procuré, au Cabinet, ſans aucuns fraix, des milliers de belles raretés. Cette variété des deux précédentes eſt préciſément celle dont le Chevalier LINNÆUS (*c*) nous a donné la toute premiere deſcription & repréſentation, ſous le nom de *Laticaudatus* dans le Cabinet du Roi de Suède. Mais ce même ſujet, dont nous parlons actuellement, bien qu'il paroiſſe, au premier coup d'œil, être l'Eſpèce que nous venons de décrire, en diffère totalement.

Nous avons remarqué, ſur les deux Eſpèces précédentes, qu'elles ne ſont point pourvuës d'écailles à l'abdomen ou à la queue, qu'ont d'ailleurs les Serpens communs; celui-ci, au contraire, en a de très reconnoiſſables, ce qui fournit une variété ſinguliere.

Les

(*b*) *Voyages de* G. DAMPIER *&* *de* L. WAFER *autour du Monde, Part. III. pag.* 60—63. *&c., Amſt.* 1717. *Edit. Holl.*

(*c*) MUSÆI ADOLPHI FRED., *Tom. I. Tab. XVI. fig.* 1. *pag.* 31 *&* 32. *Idem Syſt. Nat., pag.* 383. Colub. Laticaudatus.

HOUTTUIN, *Nat. Hiſt. der Dieren, I. Deel 6de. Stuk, pag* 391. *Breedſtartige.* (Large-Queue) *Et plus loin* (*ſous les Serpens proprement dits*) *on trouve encore un* Large-Queue *de Surinam, pag.* 424.

Les autres différences qui paroiſſent à celui-ci & qui le diſtinguent du précédent, ſont les ſuivantes:

Les bandes noires ſont plus larges, plus écartées les unes des autres, & elles ne vont pas toutes en circulant ſe réunir à une. Les trois premieres bandes ſur & proche la tête, paſſant à côté de la mâchoire inférieure, ſe rejoignent par une raie. Toutes les bandes ſont plus noires. La couleur ſur le corps eſt plombée, &, ſous le ventre, d'un blanc jaunâtre; à quoi l'on doit ajouter les écailles abdominales qu'a celui-ci, comme une marque caractériſtique capitale. Il s'en trouve un pareil dans le Cabinet de la SOCIÉTÉ HOLLANDOISE DES SCIENCES à Haerlem. Vraiſemblablement ces deux ſujets ſont des Mers des Indes Orientales.

DESCRIPTION
DU
SERPENT A QUEUE APPLATIE
ET A' ANNEAUX,
DES
MERS DE L'INDE.

Tab. II.

CE ſujet eſt auſſi repréſenté dans ſa grandeur naturelle.

Tout le corps eſt ceint de bandes ou boucles d'un noir fauve, fort près les unes des autres. La couleur dans les intervalles eſt un blanc jaunâtre pâle. Sur le ſommet de la tête & à l'extrémité de

de la bouche ſe voit pareillement une tache de couleur noire fauve. La queue applatie eſt à ſon bout d'un noir fauve. En devant, ſur la bouche, ſont auſſi deux petits trous ronds, peut-être ſes naſeaux. La tête eſt couverte de petits écuſſons.

Les yeux ſont orbiculaires, bleuâtres & ont un point blanc au milieu. Il n'a ni paupieres, ni ouies. Le corps eſt revêtu tout autour de petites écailles plates & ſerrées. Il eſt arrondi, mais s'applatit près l'origine de la queue, qui eſt auſſi plate. Il n'y a pas le moindre indice de nageoires. Sous le ventre & la queue on ne voit aucune marque d'écuſſons ni d'écailles, dont les Serpens ſont d'ailleurs auſſi pourvus.

F I N.

C. Nieuwland, Naard, ad viv. del. S. Fokke jr. sc.

PLATSTAARTSLANGEN.